



Aminostar Calcio

Abono

Descripción:

Bioestimulante conteniendo Aminoácidos y Calcio

Composición:

Calcio (CaO) soluble en agua: 10,3 % p/p – Aminoácidos libres: 2,9 % p/p – Materia orgánica: 21 %

Nitrógeno (N) total: 8,3 % p/p – Nitrógeno (N) amoniacal: 1,8 % p/p – Nitrógeno (N) nítrico: 5,1 % p/p -Nitrógeno (N) orgánico: 1,4 % p/p

Características:

– Aspecto: Líquido pardo muy oscuro – pH: 4,8 – Peso específico (20°C): 1,43 gr/cc

FRESA	300 cc/Ha	500 cc/Ha	6 l/Ha	6 aplicaciones desde la formación del fruto hasta la cosecha
TOMATE Y PEPINO	300 cc/Ha	500 cc/Ha	6 l/Ha	6 aplicaciones desde la formación del fruto hasta la cosecha
FRUTALES	300 cc/Ha	500 cc/Ha	6 l/Ha	6 aplicaciones desde la formación del fruto hasta la cosecha
COLES Y AJO	300 cc/Ha	500 cc/Ha	6 l/Ha	6 aplicaciones desde la formación del fruto hasta la cosecha

El Calcio es un nutriente esencial para el óptimo desarrollo de los frutos. Por ello es aconsejable llevarse a término un completo programa de utilización desde la postfloración hasta la recolección.

Entre los factores que pueden afectar al desarrollo vegetal, destacan: Edad de la hoja. Las hojas jóvenes son susceptibles a fitotoxicidad, por lo que es aconsejable aplicar la mitad de dosis hasta el estadio de hoja adulta.

Temperaturas. Con elevadas temperaturas las aplicaciones foliares deberán ser durante las horas más frescas del día. Con temperaturas superiores a 21° C, hay que reducir dosis y aumentar frecuencia de aplicaciones.

Garantizar la máxima absorción del Calcio. El fruto y la hoja deben mojarse bien. Es muy importante hacer los últimos tratamientos antes de la cosecha.

Cultivos:

Se recomienda su utilización en todos los cultivos.

Modo de empleo:

Para la corrección de carencias de Calcio en Horticultura, Fruticultura y cualquier cultivo en general.

Recomendado para aplicaciones foliares y al suelo de pH moderado.

Recomendado para momentos de debilidad de las plantas o situaciones de stress.

Por su composición puede ser aplicado en mezcla con la mayoría de productos fitosanitarios.

Dosificación

	Tipo de Aplicación	Dosis foliar	Riego Localizado	Nº aplicaciones
CÍTRICOS Y FRUTALES	300 - 500 cc/Ha		6 aplicaciones mínimo desde la formación del fruto hasta cerca de la cosecha	

Er
Copyright © 2026 Vitafixol
Legal

Pr

Se

No

de

contenido de sus productos y, en ningún caso por la forma de utilización realizada por el cliente. Los resultados y eficacia de nuestros productos sobre una superficie no superior a 100m2. Esta empresa no será, en ningún caso responsable de los perjuicios que se puedan causar en caso de incumplimiento de las presentes instrucciones.

