Nematiron Plus

Abono

Bioestimulante radicular

Composición:

Aminoácidos libres: 6,1 % (Glicina 2,1 % – Lisina 2 % – Acido glutámico 2 %)
Nitrógeno total (N): 1,0 % – Nitrógeno orgánico: 1,0 %

Características:

– Aspecto: Líquido amarillo transparente – pH: 2,8 – Peso específico (20°C): 1,12 gr/cc

Compuesto orgánico liquido, a base de ácidos carboxílicos y aminoácidos obtenido por fermentación natural.
Actúa como un potente Bioestimulante y revitalizador del metabolismo de la planta en condiciones adversas y de estrés, tales como sequía, fríos intensos, heladas y ataques de nematodos.
Revitaliza la raíz y la protege frente a las distintas situaciones de estrés, favoreciendo sus defensas.

Cultivos:

Se recomienda su utilización en todos los cultivos.

Modo de empleo:

* Indicado para empleo por fertirrigación como aporte de materia orgánica:
– En caso de trasplante de los cultivos y en suelos con alta concentración de nematodos.
– En todos los casos que se requiera un efecto Bioestimulante en la planta.
* Aplicación preventiva para mejorar y fortalecer las defensas de la planta en situaciones de estrés y ataque de nematodos. Aplicar de 5 a 10 días antes de la siembra o trasplante de cultivo a 60 lt. Ha, regar previamente con agua durante 2 a 3 horas y añadir el producto al final del riego

Dosificación:

Tipo de Aplicación	Dosis y Aplicaciones
FRESA	Antes del cultivo: 60 - 75 l/Ha 4 Aplicaciones de 20 l/Ha. La primera 15 días después del trasplante, las siguientes con espacio de 7 días. Repetir este ciclo de 4 tratamientos si la duración del cultivo y el problema lo requieren.
HORTALIZAS / ORNAMENTALES	Antes del cultivo: 60 - 75 l/Ha 1 aplicación de 20 l/Ha cada 7 días después del trasplante hasta 4 aplicaciones. Repetir este ciclo de 4 tratamientos si la duración del cultivo y el problema lo requieren.
PLATANERA (CON MAS DE 1 AÑO)	Antes del cultivo: 90 l/Ha Después del primer año: 3 aplicaciones de 30 l/Ha repartidas durante el año.
PATATAS Y REMOLACHA	Antes del cultivo: 60 - 75 l/Ha 1 aplicación de 20 l/Ha cada 7 días empezando 15 días después de la brotación, hasta 4 aplicaciones. Repetir este ciclo de 4 tratamientos si la duración del cultivo y el problema lo requieren.

Envases:

Presentación en envases de plástico 1, 5, 20 litros y contenedores de 1000 litros.

Se recomienda no exceder las dosis aconsejadas
Nota: La información contenida en esta hoja ha sido elaborada según nuestros conocimientos actuales y, solo debe entenderse como una guía. Esta empresa es únicamente responsable de la composición, formulación y contenido de sus productos y, en ningún caso por la forma de utilización realizada por el cliente. Los resultados y eficacia de nuestros productos sobre una superficie no superior a 100m2. Esta empresa no será, en ningún caso responsable de los perjuicios que se puedan causar en caso de incumplimiento de las presentes instrucciones.

VITAFIXOL - Polígono Industrial Can Magre | C/ Carles Buhigas, Nave 80 | Apdo. de Correos 38 - 08187 Santa Eulalia de Ronçana (Bcn) Tel. (34) 93 844 66 94